

# Regla de L'Hospital y fórmula de Taylor

## CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I

Profra. Mayra Lorena Díaz Sosa  
mlds@apolo.acatlan.unam.mx

16 de marzo de 2016

FES Acatlán

# I. Introducción

Regla de L'Hospital y fórmula de Taylor



2016-03-15

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 3 de 88

## I. Introducción

- Cuando deseamos conocer la gráfica de una función, habitualmente hacemos uso de software como Matlab, Mathematica, Maple, Maxima, entre otros.


I. Introducción

Regla de L'Hospital y fórmula de Taylor



# I. Introducción

Regla de L'Hospital y fórmula de Taylor



2016-03-15

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 4 de 88

## I. Introducción




- Por ejemplo, aquí vemos la gráfica de la función  $f(x) = e^x \ln(1 + e^{-x})$ .
- Raras veces echamos mano de las herramientas que provee el cálculo diferencial, por ejemplo:
  - El criterio de la primera derivada para identificar puntos críticos (como máximos, mínimos y puntos de inflexión) y para determinar si la función en cuestión es creciente o decreciente.
  - El criterio de la segunda derivada para determinar si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo.
  - El cálculo de límites para determinar el comportamiento de la función cuando  $x$  tiende a un valor concreto.



# I. Introducción

Regla de L'Hospital y fórmula de Taylor



2016-03-15

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 5 de 88

## I. Introducción



- Resulta natural entonces preguntarse por qué es necesario aprender todas estas técnicas del cálculo diferencial, si la gráfica de una función puede obtenerse hoy en día en forma casi inmediata por medio de software desarrollado para este propósito.
- En esta sesión trataremos de dar respuesta a esta pregunta luego de revisar los dos temas que hoy nos ocupan: las reglas de L'Hospital y la fórmula de Taylor.



## II. Objetivos

Regla de L'Hospital y fórmula de Taylor

2016-03-15

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 6 de 88

### II. Objetivos

En ocasiones, en el cálculo de límites aparecen ciertas expresiones cuya reducción no es evidente por inspección.

A estas expresiones se les llama *formas indeterminadas*.

Los objetivos de la sesión de hoy son:

- Identificar diversos tipos de formas indeterminadas en el contexto del cálculo de límites.
- Presentar las reglas de L'Hospital e identificar a qué tipo de indeterminaciones pueden aplicarse.
- Presentar la fórmula de Taylor, aplicarla al cálculo de límites e identificar para qué tipo de indeterminadas puede usarse.
- Reconocer la utilidad práctica del tema y su importancia como herramienta del cálculo diferencial.

## II. Objetivos

Regla de L'Hospital y fórmula de Taylor

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

2016-03-15

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 7 de 88

## II. Objetivos

En ocasiones, en el cálculo de límites aparecen ciertas expresiones cuya reducción no es evidente por inspección.

A estas expresiones se les llama *formas indeterminadas*.

Los objetivos de la sesión de hoy son:

- Identificar diversos tipos de formas indeterminadas en el contexto del cálculo de límites.
- Presentar las reglas de L'Hospital e identificar a qué tipo de indeterminaciones pueden aplicarse.
- Presentar la fórmula de Taylor, aplicarla al cálculo de límites e identificar para qué tipo de indeterminadas puede usarse.
- Reconocer la utilidad práctica del tema y su importancia como herramienta del cálculo diferencial.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

## II. Objetivos

Regla de L'Hospital y fórmula de Taylor

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Objetivos:

2016-03-15  
Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 8 de 88

## II. Objetivos

En ocasiones, en el cálculo de límites aparecen ciertas expresiones cuya reducción no es evidente por inspección.

A estas expresiones se les llama *formas indeterminadas*.

Los objetivos de la sesión de hoy son:

- Identificar diversos tipos de formas indeterminadas en el contexto del cálculo de límites.
- Presentar las reglas de L'Hospital e identificar a qué tipo de indeterminaciones pueden aplicarse.
- Presentar la fórmula de Taylor, aplicarla al cálculo de límites e identificar para qué tipo de indeterminadas puede usarse.
- Reconocer la utilidad práctica del tema y su importancia como herramienta del cálculo diferencial.

## II. Objetivos

Regla de L'Hospital y fórmula de Taylor

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Objetivos:

- Identificar diversos tipos de formas indeterminadas.

2016-03-15

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 9 de 88

## II. Objetivos

En ocasiones, en el cálculo de límites aparecen ciertas expresiones cuya reducción no es evidente por inspección.

A estas expresiones se les llama *formas indeterminadas*.

Los objetivos de la sesión de hoy son:

- Identificar diversos tipos de formas indeterminadas en el contexto del cálculo de límites.
- Presentar las reglas de L'Hospital e identificar a qué tipo de indeterminaciones pueden aplicarse.
- Presentar la fórmula de Taylor, aplicarla al cálculo de límites e identificar para qué tipo de indeterminadas puede usarse.
- Reconocer la utilidad práctica del tema y su importancia como herramienta del cálculo diferencial.

II. Objetivos

Regla de L'Hospital y fórmula de Taylor

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Objetivos:

- Identificar diversos tipos de formas indeterminadas.



## II. Objetivos

Regla de L'Hospital y fórmula de Taylor

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Objetivos:

- Identificar diversos tipos de formas indeterminadas.
- Presentar las reglas de L'Hospital e identificar cuándo pueden aplicarse.

2016-03-15

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 10 de 88

## II. Objetivos

En ocasiones, en el cálculo de límites aparecen ciertas expresiones cuya reducción no es evidente por inspección.

A estas expresiones se les llama *formas indeterminadas*.

Los objetivos de la sesión de hoy son:

- Identificar diversos tipos de formas indeterminadas en el contexto del cálculo de límites.
- Presentar las reglas de L'Hospital e identificar a qué tipo de indeterminaciones pueden aplicarse.
- Presentar la fórmula de Taylor, aplicarla al cálculo de límites e identificar para qué tipo de indeterminadas puede usarse.
- Reconocer la utilidad práctica del tema y su importancia como herramienta del cálculo diferencial.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Objetivos:

- Identificar diversos tipos de formas indeterminadas.
- Presentar las reglas de L'Hospital e identificar cuándo pueden aplicarse.

## II. Objetivos

Regla de L'Hospital y fórmula de Taylor

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Objetivos:

- Identificar diversos tipos de formas indeterminadas.
- Presentar las reglas de L'Hospital e identificar cuándo pueden aplicarse.
- Presentar la fórmula de Taylor y aplicarla al cálculo de límites.

2016-03-15

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 11 de 88

## II. Objetivos

En ocasiones, en el cálculo de límites aparecen ciertas expresiones cuya reducción no es evidente por inspección.

A estas expresiones se les llama *formas indeterminadas*.

Los objetivos de la sesión de hoy son:

- Identificar diversos tipos de formas indeterminadas en el contexto del cálculo de límites.
- Presentar las reglas de L'Hospital e identificar a qué tipo de indeterminaciones pueden aplicarse.
- Presentar la fórmula de Taylor, aplicarla al cálculo de límites e identificar para qué tipo de indeterminadas puede usarse.
- Reconocer la utilidad práctica del tema y su importancia como herramienta del cálculo diferencial.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Objetivos:

- Identificar diversos tipos de formas indeterminadas.
- Presentar las reglas de L'Hospital e identificar cuándo pueden aplicarse.
- Presentar la fórmula de Taylor y aplicarla al cálculo de límites.

## II. Objetivos

Regla de L'Hospital y fórmula de Taylor

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Objetivos:

- Identificar diversos tipos de formas indeterminadas.
- Presentar las reglas de L'Hospital e identificar cuándo pueden aplicarse.
- Presentar la fórmula de Taylor y aplicarla al cálculo de límites.
- Reconocer la utilidad práctica del tema, así como su importancia.

2016-03-15

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 12 de 88

## II. Objetivos

En ocasiones, en el cálculo de límites aparecen ciertas expresiones cuya reducción no es evidente por inspección.

A estas expresiones se les llama *formas indeterminadas*.

Los objetivos de la sesión de hoy son:

- Identificar diversos tipos de formas indeterminadas en el contexto del cálculo de límites.
- Presentar las reglas de L'Hospital e identificar a qué tipo de indeterminaciones pueden aplicarse.
- Presentar la fórmula de Taylor, aplicarla al cálculo de límites e identificar para qué tipo de indeterminadas puede usarse.
- Reconocer la utilidad práctica del tema y su importancia como herramienta del cálculo diferencial.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Objetivos:

- Identificar diversos tipos de formas indeterminadas.
- Presentar las reglas de L'Hospital e identificar cuándo pueden aplicarse.
- Presentar la fórmula de Taylor y aplicarla al cálculo de límites.
- Reconocer la utilidad práctica del tema, así como su importancia.

## III. Reglas de L'Hospital

Recordemos brevemente el concepto de límite:

- En un sentido intuitivo, decir que  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$  significa que cuando  $x$  está cerca de  $x_0$ , pero no en  $x_0$ , la función  $f(x)$  está cerca de  $L$ .
- En otras palabras, la diferencia entre  $f(x)$  y  $L$  se puede hacer arbitrariamente pequeña con tal que  $x$  esté lo suficientemente cerca de  $x_0$  pero sea diferente de  $x_0$ .
- ¿Pero qué tan cerca de  $x_0$ ? ¿Cuánto es suficiente? Esto se establece en la definición formal de límite a través de los números  $\epsilon$  y  $\delta$  (notemos que primero se da el número  $\epsilon$  y luego debe hallarse el valor de  $\delta$  que satisface la respectiva desigualdad).

## Notación:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L.$$

## III. Reglas de L'Hospital

Recordemos brevemente el concepto de límite:

- En un sentido intuitivo, decir que  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$  significa que cuando  $x$  está cerca de  $x_0$ , pero no en  $x_0$ , la función  $f(x)$  está cerca de  $L$ .
- En otras palabras, la diferencia entre  $f(x)$  y  $L$  se puede hacer arbitrariamente pequeña con tal que  $x$  esté lo suficientemente cerca de  $x_0$  pero sea diferente de  $x_0$ .
- ¿Pero qué tan cerca de  $x_0$ ? ¿Cuánto es suficiente? Esto se establece en la definición formal de límite a través de los números  $\epsilon$  y  $\delta$  (notemos que primero se da el número  $\epsilon$  y luego debe hallarse el valor de  $\delta$  que satisface la respectiva desigualdad).

## III. Reglas de L'Hospital

III. Reglas de L'Hospital  
Fundamentos teóricos — El concepto de límite

Notación:  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ .

**Definición de límite**  
Se dice que el número  $L$  es el límite de la función  $f$  en  $x_0$  si para cada número  $\epsilon > 0$ , existe un número  $\delta > 0$  tal que siempre que  $x$  esté en el dominio de  $f$  y  $0 < |x - x_0| < \delta$  entonces  $|f(x) - L| < \epsilon$ .

### Notación:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L.$$

### Definición de límite

Se dice que el número  $L$  es el *límite de la función*  $f$  en  $x_0$  si para cada número  $\epsilon > 0$ , existe un número  $\delta > 0$  tal que siempre que  $x$  esté en el dominio de  $f$  y  $0 < |x - x_0| < \delta$  entonces  $|f(x) - L| < \epsilon$ .

Recordemos brevemente el concepto de límite:

- En un sentido intuitivo, decir que  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$  significa que cuando  $x$  está cerca de  $x_0$ , pero no en  $x_0$ , la función  $f(x)$  está cerca de  $L$ .
- En otras palabras, la diferencia entre  $f(x)$  y  $L$  se puede hacer arbitrariamente pequeña con tal que  $x$  esté lo suficientemente cerca de  $x_0$  pero sea diferente de  $x_0$ .
- ¿Pero qué tan cerca de  $x_0$ ? ¿Cuánto es suficiente? Esto se establece en la definición formal de límite a través de los números  $\epsilon$  y  $\delta$  (notemos que primero se da el número  $\epsilon$  y luego debe hallarse el valor de  $\delta$  que satisface la respectiva desigualdad).

## Notación:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L.$$

### Definición de límite

Se dice que el número  $L$  es el *límite de la función*  $f$  en  $x_0$  si para cada número  $\epsilon > 0$ , existe un número  $\delta > 0$  tal que siempre que  $x$  esté en el dominio de  $f$  y  $0 < |x - x_0| < \delta$  entonces  $|f(x) - L| < \epsilon$ .

## III. Reglas de L'Hospital

Recordemos brevemente el concepto de límite:

- En un sentido intuitivo, decir que  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$  significa que cuando  $x$  está cerca de  $x_0$ , pero no en  $x_0$ , la función  $f(x)$  está cerca de  $L$ .
- En otras palabras, la diferencia entre  $f(x)$  y  $L$  se puede hacer arbitrariamente pequeña con tal que  $x$  esté lo suficientemente cerca de  $x_0$  pero sea diferente de  $x_0$ .
- ¿Pero qué tan cerca de  $x_0$ ? ¿Cuánto es suficiente? Esto se establece en la definición formal de límite a través de los números  $\epsilon$  y  $\delta$  (notemos que primero se da el número  $\epsilon$  y luego debe hallarse el valor de  $\delta$  que satisface la respectiva desigualdad).

III. Reglas de L'Hospital  
Fundamentos teóricos — El concepto de límite

Notación:  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ .

**Definición de límite**  
Se dice que el número  $L$  es el límite de la función  $f$  en  $x_0$  si para cada número  $\epsilon > 0$ , existe un número  $\delta > 0$  tal que siempre que  $x$  esté en el dominio de  $f$  y  $0 < |x - x_0| < \delta$  entonces  $|f(x) - L| < \epsilon$ .

## III. Reglas de L'Hospital

III. Reglas de L'Hospital  
Fundamentos teóricos — El concepto de límite

Notación:  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ .

**Definición de límite**  
Se dice que el número  $L$  es el límite de la función  $f$  en  $x_0$  si para cada número  $\epsilon > 0$ , existe un número  $\delta > 0$  tal que siempre que  $x$  esté en el dominio de  $f$  y  $0 < |x - x_0| < \delta$  entonces  $|f(x) - L| < \epsilon$ .

### Notación:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L.$$

### Definición de límite

Se dice que el número  $L$  es el *límite de la función*  $f$  en  $x_0$  si para cada número  $\epsilon > 0$ , existe un número  $\delta > 0$  tal que siempre que  $x$  esté en el dominio de  $f$  y  $0 < |x - x_0| < \delta$  entonces  $|f(x) - L| < \epsilon$ .

Recordemos brevemente el concepto de límite:

- En un sentido intuitivo, decir que  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$  significa que cuando  $x$  está cerca de  $x_0$ , pero no en  $x_0$ , la función  $f(x)$  está cerca de  $L$ .
- En otras palabras, la diferencia entre  $f(x)$  y  $L$  se puede hacer arbitrariamente pequeña con tal que  $x$  esté lo suficientemente cerca de  $x_0$  pero sea diferente de  $x_0$ .
- ¿Pero qué tan cerca de  $x_0$ ? ¿Cuánto es suficiente? Esto se establece en la definición formal de límite a través de los números  $\epsilon$  y  $\delta$  (notemos que primero se da el número  $\epsilon$  y luego debe hallarse el valor de  $\delta$  que satisface la respectiva desigualdad).



## III. Reglas de L'Hospital

- Dentro del escenario de los límites con cierta frecuencia se presentan formas indeterminadas, es decir, expresiones cuya reducción no es evidente por inspección, como las que se aprecian en este cuadro con sus respectivos ejemplos.
- Las formas indeterminadas de los tipos  $[0/0]$  y  $[\infty/\infty]$  son las más comunes.
- Existe un método para dar tratamiento a estos casos particulares cuando no es posible hacer manipulaciones algebraicas que permitan la cancelación de factores comunes para evaluar el límite, conocido como *Reglas de L'Hospital* y que veremos en esta ocasión.
- Los límites que involucran los demás tipos de indeterminaciones con frecuencia pueden reducirse a los tipos  $[0/0]$  o  $[\infty/\infty]$  mediante manipulaciones algebraicas o por medio del uso de logaritmos.

## III. Reglas de L'Hospital

Tipo	Ejemplo
[0/0]	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x}$

- Dentro del escenario de los límites con cierta frecuencia se presentan formas indeterminadas, es decir, expresiones cuya reducción no es evidente por inspección, como las que se aprecian en este cuadro con sus respectivos ejemplos.
- Las formas indeterminadas de los tipos  $[0/0]$  y  $[\infty/\infty]$  son las más comunes.
- Existe un método para dar tratamiento a estos casos particulares cuando no es posible hacer manipulaciones algebraicas que permitan la cancelación de factores comunes para evaluar el límite, conocido como *Reglas de L'Hospital* y que veremos en esta ocasión.
- Los límites que involucran los demás tipos de indeterminaciones con frecuencia pueden reducirse a los tipos  $[0/0]$  o  $[\infty/\infty]$  mediante manipulaciones algebraicas o por medio del uso de logaritmos.

# III. Reglas de L'Hospital

Fundamentos teóricos — Formas indeterminadas

Tipo	Ejemplo
$[0/0]$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x}$
$[\infty/\infty]$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1/x^2)}{\cot(x^2)}$

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 20 de 88

2016-03-15

## III. Reglas de L'Hospital

III. Reglas de L'Hospital

Fundamentos teóricos — Formas indeterminadas

Tipo	Ejemplo
$[0/0]$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x}$
$[\infty/\infty]$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1/x^2)}{\cot(x^2)}$

- Dentro del escenario de los límites con cierta frecuencia se presentan formas indeterminadas, es decir, expresiones cuya reducción no es evidente por inspección, como las que se aprecian en este cuadro con sus respectivos ejemplos.
- Las formas indeterminadas de los tipos  $[0/0]$  y  $[\infty/\infty]$  son las más comunes.
- Existe un método para dar tratamiento a estos casos particulares cuando no es posible hacer manipulaciones algebraicas que permitan la cancelación de factores comunes para evaluar el límite, conocido como *Reglas de L'Hospital* y que veremos en esta ocasión.
- Los límites que involucran los demás tipos de indeterminaciones con frecuencia pueden reducirse a los tipos  $[0/0]$  o  $[\infty/\infty]$  mediante manipulaciones algebraicas o por medio del uso de logaritmos.

# III. Reglas de L'Hospital

Fundamentos teóricos — Formas indeterminadas

Tipo	Ejemplo
$[0/0]$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x}$
$[\infty/\infty]$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1/x^2)}{\cot(x^2)}$
$[0 \cdot \infty]$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(1/x)$

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 21 de 88

2016-03-15

## III. Reglas de L'Hospital

III. Reglas de L'Hospital

Fundamentos teóricos — Formas indeterminadas

Tipo	Ejemplo
$[0/0]$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x}$
$[\infty/\infty]$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1/x^2)}{\cot(x^2)}$
$[0 \cdot \infty]$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(1/x)$

- Dentro del escenario de los límites con cierta frecuencia se presentan formas indeterminadas, es decir, expresiones cuya reducción no es evidente por inspección, como las que se aprecian en este cuadro con sus respectivos ejemplos.
- Las formas indeterminadas de los tipos  $[0/0]$  y  $[\infty/\infty]$  son las más comunes.
- Existe un método para dar tratamiento a estos casos particulares cuando no es posible hacer manipulaciones algebraicas que permitan la cancelación de factores comunes para evaluar el límite, conocido como *Reglas de L'Hospital* y que veremos en esta ocasión.
- Los límites que involucran los demás tipos de indeterminaciones con frecuencia pueden reducirse a los tipos  $[0/0]$  o  $[\infty/\infty]$  mediante manipulaciones algebraicas o por medio del uso de logaritmos.

# III. Reglas de L'Hospital

Fundamentos teóricos — Formas indeterminadas

Tipo	Ejemplo
$[0/0]$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x}$
$[\infty/\infty]$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1/x^2)}{\cot(x^2)}$
$[0 \cdot \infty]$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(1/x)$
$[\infty - \infty]$	$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \left( \tan(x) - \frac{1}{\pi - 2x} \right)$

## III. Reglas de L'Hospital

- Dentro del escenario de los límites con cierta frecuencia se presentan formas indeterminadas, es decir, expresiones cuya reducción no es evidente por inspección, como las que se aprecian en este cuadro con sus respectivos ejemplos.
- Las formas indeterminadas de los tipos  $[0/0]$  y  $[\infty/\infty]$  son las más comunes.
- Existe un método para dar tratamiento a estos casos particulares cuando no es posible hacer manipulaciones algebraicas que permitan la cancelación de factores comunes para evaluar el límite, conocido como *Reglas de L'Hospital* y que veremos en esta ocasión.
- Los límites que involucran los demás tipos de indeterminaciones con frecuencia pueden reducirse a los tipos  $[0/0]$  o  $[\infty/\infty]$  mediante manipulaciones algebraicas o por medio del uso de logaritmos.

Tipo	Ejemplo
$[0/0]$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x}$
$[\infty/\infty]$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1/x^2)}{\cot(x^2)}$
$[0 \cdot \infty]$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(1/x)$
$[\infty - \infty]$	$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \left( \tan(x) - \frac{1}{\pi - 2x} \right)$

# III. Reglas de L'Hospital

Fundamentos teóricos — Formas indeterminadas

Tipo	Ejemplo
$[0/0]$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x}$
$[\infty/\infty]$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1/x^2)}{\cot(x^2)}$
$[0 \cdot \infty]$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(1/x)$
$[\infty - \infty]$	$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \left( \tan(x) - \frac{1}{\pi - 2x} \right)$
$[0^0]$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$

2016-03-15

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 23 de 88

## III. Reglas de L'Hospital

III. Reglas de L'Hospital

Fundamentos teóricos — Formas indeterminadas

Tipo	Ejemplo
$[0/0]$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x}$
$[\infty/\infty]$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1/x^2)}{\cot(x^2)}$
$[0 \cdot \infty]$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(1/x)$
$[\infty - \infty]$	$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \left( \tan(x) - \frac{1}{\pi - 2x} \right)$
$[0^0]$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$

- Dentro del escenario de los límites con cierta frecuencia se presentan formas indeterminadas, es decir, expresiones cuya reducción no es evidente por inspección, como las que se aprecian en este cuadro con sus respectivos ejemplos.
- Las formas indeterminadas de los tipos  $[0/0]$  y  $[\infty/\infty]$  son las más comunes.
- Existe un método para dar tratamiento a estos casos particulares cuando no es posible hacer manipulaciones algebraicas que permitan la cancelación de factores comunes para evaluar el límite, conocido como *Reglas de L'Hospital* y que veremos en esta ocasión.
- Los límites que involucran los demás tipos de indeterminaciones con frecuencia pueden reducirse a los tipos  $[0/0]$  o  $[\infty/\infty]$  mediante manipulaciones algebraicas o por medio del uso de logaritmos.

# III. Reglas de L'Hospital

Fundamentos teóricos — Formas indeterminadas

Tipo	Ejemplo
$[0/0]$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x}$
$[\infty/\infty]$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1/x^2)}{\cot(x^2)}$
$[0 \cdot \infty]$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(1/x)$
$[\infty - \infty]$	$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \left( \tan(x) - \frac{1}{\pi - 2x} \right)$
$[0^0]$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$
$[\infty^0]$	$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} (\tan(x))^{\cos(x)}$

2016-03-15

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 24 de 88

## III. Reglas de L'Hospital

III. Reglas de L'Hospital

Tipo	Ejemplo
$[0/0]$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x}$
$[\infty/\infty]$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1/x^2)}{\cot(x^2)}$
$[0 \cdot \infty]$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(1/x)$
$[\infty - \infty]$	$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \left( \tan(x) - \frac{1}{\pi - 2x} \right)$
$[0^0]$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$
$[\infty^0]$	$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} (\tan(x))^{\cos(x)}$

- Dentro del escenario de los límites con cierta frecuencia se presentan formas indeterminadas, es decir, expresiones cuya reducción no es evidente por inspección, como las que se aprecian en este cuadro con sus respectivos ejemplos.
- Las formas indeterminadas de los tipos  $[0/0]$  y  $[\infty/\infty]$  son las más comunes.
- Existe un método para dar tratamiento a estos casos particulares cuando no es posible hacer manipulaciones algebraicas que permitan la cancelación de factores comunes para evaluar el límite, conocido como *Reglas de L'Hospital* y que veremos en esta ocasión.
- Los límites que involucran los demás tipos de indeterminaciones con frecuencia pueden reducirse a los tipos  $[0/0]$  o  $[\infty/\infty]$  mediante manipulaciones algebraicas o por medio del uso de logaritmos.

# III. Reglas de L'Hospital

Fundamentos teóricos — Formas indeterminadas

Tipo	Ejemplo
$[0/0]$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x}$
$[\infty/\infty]$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1/x^2)}{\cot(x^2)}$
$[0 \cdot \infty]$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(1/x)$
$[\infty - \infty]$	$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \left( \tan(x) - \frac{1}{\pi - 2x} \right)$
$[0^0]$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$
$[\infty^0]$	$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} (\tan(x))^{\cos(x)}$
$[1^\infty]$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{x} \right)^x$

2016-03-15

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 25 de 88

## III. Reglas de L'Hospital

III. Reglas de L'Hospital

Tipo	Ejemplo
$[0/0]$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x}$
$[\infty/\infty]$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1/x^2)}{\cot(x^2)}$
$[0 \cdot \infty]$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(1/x)$
$[\infty - \infty]$	$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \left( \tan(x) - \frac{1}{\pi - 2x} \right)$
$[0^0]$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$
$[\infty^0]$	$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} (\tan(x))^{\cos(x)}$
$[1^\infty]$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{x} \right)^x$

- Dentro del escenario de los límites con cierta frecuencia se presentan formas indeterminadas, es decir, expresiones cuya reducción no es evidente por inspección, como las que se aprecian en este cuadro con sus respectivos ejemplos.
- Las formas indeterminadas de los tipos  $[0/0]$  y  $[\infty/\infty]$  son las más comunes.
- Existe un método para dar tratamiento a estos casos particulares cuando no es posible hacer manipulaciones algebraicas que permitan la cancelación de factores comunes para evaluar el límite, conocido como *Reglas de L'Hospital* y que veremos en esta ocasión.
- Los límites que involucran los demás tipos de indeterminaciones con frecuencia pueden reducirse a los tipos  $[0/0]$  o  $[\infty/\infty]$  mediante manipulaciones algebraicas o por medio del uso de logaritmos.



# III. Reglas de L'Hospital

Fundamentos teóricos — Formas indeterminadas

Tipo	Ejemplo
$[0/0]$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x}$
$[\infty/\infty]$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1/x^2)}{\cot(x^2)}$
$[0 \cdot \infty]$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(1/x)$
$[\infty - \infty]$	$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \left( \tan(x) - \frac{1}{\pi - 2x} \right)$
$[0^0]$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$
$[\infty^0]$	$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} (\tan(x))^{\cos(x)}$
$[1^\infty]$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{x} \right)^x$

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 26 de 88

2016-03-15

## III. Reglas de L'Hospital

III. Reglas de L'Hospital

Tipo	Ejemplo
$[0/0]$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x}$
$[\infty/\infty]$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1/x^2)}{\cot(x^2)}$
$[0 \cdot \infty]$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(1/x)$
$[\infty - \infty]$	$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \left( \tan(x) - \frac{1}{\pi - 2x} \right)$
$[0^0]$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$
$[\infty^0]$	$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} (\tan(x))^{\cos(x)}$
$[1^\infty]$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{x} \right)^x$

- Dentro del escenario de los límites con cierta frecuencia se presentan formas indeterminadas, es decir, expresiones cuya reducción no es evidente por inspección, como las que se aprecian en este cuadro con sus respectivos ejemplos.
- Las formas indeterminadas de los tipos  $[0/0]$  y  $[\infty/\infty]$  son las más comunes.
- Existe un método para dar tratamiento a estos casos particulares cuando no es posible hacer manipulaciones algebraicas que permitan la cancelación de factores comunes para evaluar el límite, conocido como *Reglas de L'Hospital* y que veremos en esta ocasión.
- Los límites que involucran los demás tipos de indeterminaciones con frecuencia pueden reducirse a los tipos  $[0/0]$  o  $[\infty/\infty]$  mediante manipulaciones algebraicas o por medio del uso de logaritmos.

# III. Reglas de L'Hospital

Fundamentos teóricos — Formas indeterminadas

Tipo	Ejemplo
$[0/0]$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x}$
$[\infty/\infty]$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1/x^2)}{\cot(x^2)}$
$[0 \cdot \infty]$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(1/x)$
$[\infty - \infty]$	$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \left( \tan(x) - \frac{1}{\pi - 2x} \right)$
$[0^0]$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$
$[\infty^0]$	$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} (\tan(x))^{\cos(x)}$
$[1^\infty]$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{x} \right)^x$

2016-03-15

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 27 de 88

## III. Reglas de L'Hospital

III. Reglas de L'Hospital

Tipo	Ejemplo
$[0/0]$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x}$
$[\infty/\infty]$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1/x^2)}{\cot(x^2)}$
$[0 \cdot \infty]$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(1/x)$
$[\infty - \infty]$	$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \left( \tan(x) - \frac{1}{\pi - 2x} \right)$
$[0^0]$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$
$[\infty^0]$	$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} (\tan(x))^{\cos(x)}$
$[1^\infty]$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{x} \right)^x$

- Dentro del escenario de los límites con cierta frecuencia se presentan formas indeterminadas, es decir, expresiones cuya reducción no es evidente por inspección, como las que se aprecian en este cuadro con sus respectivos ejemplos.
- Las formas indeterminadas de los tipos  $[0/0]$  y  $[\infty/\infty]$  son las más comunes.
- Existe un método para dar tratamiento a estos casos particulares cuando no es posible hacer manipulaciones algebraicas que permitan la cancelación de factores comunes para evaluar el límite, conocido como *Reglas de L'Hospital* y que veremos en esta ocasión.
- Los límites que involucran los demás tipos de indeterminaciones con frecuencia pueden reducirse a los tipos  $[0/0]$  o  $[\infty/\infty]$  mediante manipulaciones algebraicas o por medio del uso de logaritmos.

# III. Reglas de L'Hospital

Fundamentos teóricos — Formas indeterminadas

Tipo	Ejemplo
$[0/0]$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x}$
$[\infty/\infty]$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1/x^2)}{\cot(x^2)}$
$[0 \cdot \infty]$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(1/x)$
$[\infty - \infty]$	$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \left( \tan(x) - \frac{1}{\pi - 2x} \right)$
$[0^0]$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$
$[\infty^0]$	$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} (\tan(x))^{\cos(x)}$
$[1^\infty]$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$

2016-03-15

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 28 de 88

## III. Reglas de L'Hospital

III. Reglas de L'Hospital

Tipo	Ejemplo
$[0/0]$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x}$
$[\infty/\infty]$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1/x^2)}{\cot(x^2)}$
$[0 \cdot \infty]$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(1/x)$
$[\infty - \infty]$	$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \left( \tan(x) - \frac{1}{\pi - 2x} \right)$
$[0^0]$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$
$[\infty^0]$	$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} (\tan(x))^{\cos(x)}$
$[1^\infty]$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$

- Dentro del escenario de los límites con cierta frecuencia se presentan formas indeterminadas, es decir, expresiones cuya reducción no es evidente por inspección, como las que se aprecian en este cuadro con sus respectivos ejemplos.
- Las formas indeterminadas de los tipos  $[0/0]$  y  $[\infty/\infty]$  son las más comunes.
- Existe un método para dar tratamiento a estos casos particulares cuando no es posible hacer manipulaciones algebraicas que permitan la cancelación de factores comunes para evaluar el límite, conocido como *Reglas de L'Hospital* y que veremos en esta ocasión.
- Los límites que involucran los demás tipos de indeterminaciones con frecuencia pueden reducirse a los tipos  $[0/0]$  o  $[\infty/\infty]$  mediante manipulaciones algebraicas o por medio del uso de logaritmos.

# III. Reglas de L'Hospital

Fundamentos teóricos — Formas indeterminadas

Tipo	Ejemplo
$[0/0]$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x}$
$[\infty/\infty]$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1/x^2)}{\cot(x^2)}$
$[0 \cdot \infty]$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(1/x)$
$[\infty - \infty]$	$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \left( \tan(x) - \frac{1}{\pi - 2x} \right)$
$[0^0]$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$
$[\infty^0]$	$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} (\tan(x))^{\cos(x)}$
$[1^\infty]$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{x} \right)^x$

2016-03-15

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 29 de 88

## III. Reglas de L'Hospital


III. Reglas de L'Hospital

Tipo	Ejemplo
$[0/0]$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x}$
$[\infty/\infty]$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1/x^2)}{\cot(x^2)}$
$[0 \cdot \infty]$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(1/x)$
$[\infty - \infty]$	$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \left( \tan(x) - \frac{1}{\pi - 2x} \right)$
$[0^0]$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$
$[\infty^0]$	$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} (\tan(x))^{\cos(x)}$
$[1^\infty]$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{x} \right)^x$

- Dentro del escenario de los límites con cierta frecuencia se presentan formas indeterminadas, es decir, expresiones cuya reducción no es evidente por inspección, como las que se aprecian en este cuadro con sus respectivos ejemplos.
- Las formas indeterminadas de los tipos  $[0/0]$  y  $[\infty/\infty]$  son las más comunes.
- Existe un método para dar tratamiento a estos casos particulares cuando no es posible hacer manipulaciones algebraicas que permitan la cancelación de factores comunes para evaluar el límite, conocido como *Reglas de L'Hospital* y que veremos en esta ocasión.
- Los límites que involucran los demás tipos de indeterminaciones con frecuencia pueden reducirse a los tipos  $[0/0]$  o  $[\infty/\infty]$  mediante manipulaciones algebraicas o por medio del uso de logaritmos.

## III. Reglas de L'Hospital

- La primera regla de L'Hospital permite evaluar únicamente límites del tipo  $[0/0]$ : una vez identificado este caso en un límite, éste puede reemplazarse por el límite del cociente de las derivadas, ya que este último es igual al primero.
- Si el límite del cociente de las derivadas continuara siendo una forma indeterminada, podría aplicarse la regla de L'Hospital por etapas tantas veces como fuera necesario para poder evaluar el límite, siempre que las condiciones (i) y (ii) continuaran verificándose en cada etapa.
- El teorema se cumple también para  $\lim_{x \rightarrow a^+}$  y  $\lim_{x \rightarrow b^-}$ . Los casos  $a = -\infty$  y  $b = \infty$  también se verifican.
- Es importante notar que la regla de L'Hospital calcula el cociente de las derivadas y no la derivada del cociente.
- La regla puede demostrarse haciendo uso del teorema del valor medio.



## Primera regla de L'Hospital

Supongamos que las funciones  $f$  y  $g$  son diferenciables en  $(a, b)$  y que  $g'(x) \neq 0$  en dicho intervalo. Si para  $a < x_0 < b$

(i)  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$  y


(ii)  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L,$

entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

## III. Reglas de L'Hospital

- La primera regla de L'Hospital permite evaluar únicamente límites del tipo  $[0/0]$ : una vez identificado este caso en un límite, éste puede reemplazarse por el límite del cociente de las derivadas, ya que este último es igual al primero.
- Si el límite del cociente de las derivadas continuara siendo una forma indeterminada, podría aplicarse la regla de L'Hospital por etapas tantas veces como fuera necesario para poder evaluar el límite, siempre que las condiciones (i) y (ii) continuaran verificándose en cada etapa.
- El teorema se cumple también para  $\lim_{x \rightarrow a^+}$  y  $\lim_{x \rightarrow b^-}$ . Los casos  $a = -\infty$  y  $b = \infty$  también se verifican.
- Es importante notar que la regla de L'Hospital calcula el cociente de las derivadas y no la derivada del cociente.
- La regla puede demostrarse haciendo uso del teorema del valor medio.



## Primera regla de L'Hospital

Supongamos que las funciones  $f$  y  $g$  son diferenciables en  $(a, b)$  y que  $g'(x) \neq 0$  en dicho intervalo. Si para  $a < x_0 < b$

(i)  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$  y

(ii)  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L,$

entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

## III. Reglas de L'Hospital

- La primera regla de L'Hospital permite evaluar únicamente límites del tipo  $[0/0]$ : una vez identificado este caso en un límite, éste puede reemplazarse por el límite del cociente de las derivadas, ya que este último es igual al primero.
- Si el límite del cociente de las derivadas continuara siendo una forma indeterminada, podría aplicarse la regla de L'Hospital por etapas tantas veces como fuera necesario para poder evaluar el límite, siempre que las condiciones (i) y (ii) continuaran verificándose en cada etapa.
- El teorema se cumple también para  $\lim_{x \rightarrow a^+}$  y  $\lim_{x \rightarrow b^-}$ . Los casos  $a = -\infty$  y  $b = \infty$  también se verifican.
- Es importante notar que la regla de L'Hospital calcula el cociente de las derivadas y no la derivada del cociente.
- La regla puede demostrarse haciendo uso del teorema del valor medio.

# III. Reglas de L'Hospital

Fundamentos teóricos — Primera regla

## Primera regla de L'Hospital

Supongamos que las funciones  $f$  y  $g$  son diferenciables en  $(a, b)$  y que  $g'(x) \neq 0$  en dicho intervalo. Si para  $a < x_0 < b$

$$(i) \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0 \text{ y}$$

$$(ii) \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L,$$

entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 33 de 88

2016-03-15

## III. Reglas de L'Hospital

III. Reglas de L'Hospital

Fundamentos teóricos — Primera regla

Primera regla de L'Hospital

Supongamos que las funciones  $f$  y  $g$  son diferenciables en  $(a, b)$  y que  $g'(x) \neq 0$  en dicho intervalo. Si para  $a < x_0 < b$

(i)  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$  y

(ii)  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$ ,

entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

- La primera regla de L'Hospital permite evaluar únicamente límites del tipo  $[0/0]$ : una vez identificado este caso en un límite, éste puede reemplazarse por el límite del cociente de las derivadas, ya que este último es igual al primero.
- Si el límite del cociente de las derivadas continuara siendo una forma indeterminada, podría aplicarse la regla de L'Hospital por etapas tantas veces como fuera necesario para poder evaluar el límite, siempre que las condiciones (i) y (ii) continuaran verificándose en cada etapa.
- El teorema se cumple también para  $\lim_{x \rightarrow a^+}$  y  $\lim_{x \rightarrow b^-}$ . Los casos  $a = -\infty$  y  $b = \infty$  también se verifican.
- Es importante notar que la regla de L'Hospital calcula el cociente de las derivadas y no la derivada del cociente.
- La regla puede demostrarse haciendo uso del teorema del valor medio.



## Primera regla de L'Hospital

Supongamos que las funciones  $f$  y  $g$  son diferenciables en  $(a, b)$  y que  $g'(x) \neq 0$  en dicho intervalo. Si para  $a < x_0 < b$


(i)  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$  y

(ii)  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L,$


entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

## III. Reglas de L'Hospital



- La primera regla de L'Hospital permite evaluar únicamente límites del tipo  $[0/0]$ : una vez identificado este caso en un límite, éste puede reemplazarse por el límite del cociente de las derivadas, ya que este último es igual al primero.
- Si el límite del cociente de las derivadas continuara siendo una forma indeterminada, podría aplicarse la regla de L'Hospital por etapas tantas veces como fuera necesario para poder evaluar el límite, siempre que las condiciones (i) y (ii) continuaran verificándose en cada etapa.
- El teorema se cumple también para  $\lim_{x \rightarrow a^+}$  y  $\lim_{x \rightarrow b^-}$ . Los casos  $a = -\infty$  y  $b = \infty$  también se verifican.
- Es importante notar que la regla de L'Hospital calcula el cociente de las derivadas y no la derivada del cociente.
- La regla puede demostrarse haciendo uso del teorema del valor medio.



## Primera regla de L'Hospital

Supongamos que las funciones  $f$  y  $g$  son diferenciables en  $(a, b)$  y que  $g'(x) \neq 0$  en dicho intervalo. Si para  $a < x_0 < b$

(i)  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$  y


(ii)  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L,$

entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

## III. Reglas de L'Hospital

- La primera regla de L'Hospital permite evaluar únicamente límites del tipo  $[0/0]$ : una vez identificado este caso en un límite, éste puede reemplazarse por el límite del cociente de las derivadas, ya que este último es igual al primero.
- Si el límite del cociente de las derivadas continuara siendo una forma indeterminada, podría aplicarse la regla de L'Hospital por etapas tantas veces como fuera necesario para poder evaluar el límite, siempre que las condiciones (i) y (ii) continuaran verificándose en cada etapa.
- El teorema se cumple también para  $\lim_{x \rightarrow a^+}$  y  $\lim_{x \rightarrow b^-}$ . Los casos  $a = -\infty$  y  $b = \infty$  también se verifican.
- Es importante notar que la regla de L'Hospital calcula el cociente de las derivadas y no la derivada del cociente.
- La regla puede demostrarse haciendo uso del teorema del valor medio.



## Primera regla de L'Hospital

Supongamos que las funciones  $f$  y  $g$  son diferenciables en  $(a, b)$  y que  $g'(x) \neq 0$  en dicho intervalo. Si para  $a < x_0 < b$

(i)  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$  y


(ii)  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L,$

entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

## III. Reglas de L'Hospital

- La primera regla de L'Hospital permite evaluar únicamente límites del tipo  $[0/0]$ : una vez identificado este caso en un límite, éste puede reemplazarse por el límite del cociente de las derivadas, ya que este último es igual al primero.
- Si el límite del cociente de las derivadas continuara siendo una forma indeterminada, podría aplicarse la regla de L'Hospital por etapas tantas veces como fuera necesario para poder evaluar el límite, siempre que las condiciones (i) y (ii) continuaran verificándose en cada etapa.
- El teorema se cumple también para  $\lim_{x \rightarrow a^+}$  y  $\lim_{x \rightarrow b^-}$ . Los casos  $a = -\infty$  y  $b = \infty$  también se verifican.
- Es importante notar que la regla de L'Hospital calcula el cociente de las derivadas y no la derivada del cociente.
- La regla puede demostrarse haciendo uso del teorema del valor medio.



## Primera regla de L'Hospital

Supongamos que las funciones  $f$  y  $g$  son diferenciables en  $(a, b)$  y que  $g'(x) \neq 0$  en dicho intervalo. Si para  $a < x_0 < b$

(i)  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$  y

(ii)  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L,$

entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

## III. Reglas de L'Hospital

- La primera regla de L'Hospital permite evaluar únicamente límites del tipo  $[0/0]$ : una vez identificado este caso en un límite, éste puede reemplazarse por el límite del cociente de las derivadas, ya que este último es igual al primero.
- Si el límite del cociente de las derivadas continuara siendo una forma indeterminada, podría aplicarse la regla de L'Hospital por etapas tantas veces como fuera necesario para poder evaluar el límite, siempre que las condiciones (i) y (ii) continuaran verificándose en cada etapa.
- El teorema se cumple también para  $\lim_{x \rightarrow a^+}$  y  $\lim_{x \rightarrow b^-}$ . Los casos  $a = -\infty$  y  $b = \infty$  también se verifican.
- Es importante notar que la regla de L'Hospital calcula el cociente de las derivadas y no la derivada del cociente.
- La regla puede demostrarse haciendo uso del teorema del valor medio.

# III. Reglas de L'Hospital

Fundamentos teóricos — Segunda regla

2016-03-15

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 38 de 88

III. Reglas de L'Hospital

Fundamentos teóricos — Segunda regla

## III. Reglas de L'Hospital

- La segunda regla de L'Hospital permite evaluar cualquier límite del tipo  $[\infty/\infty]$  (aunque estrictamente hablando puede aplicarse a indeterminaciones del tipo  $[k/\infty]$ , no hay caso en hacer esto si  $k$  no es  $\infty$ , pues de ser así el límite es obviamente 0).
- Al igual que la primera regla de L'Hospital, esta regla puede aplicarse por etapas.
- El teorema se cumple también para  $\lim_{x \rightarrow a^+}$  y  $\lim_{x \rightarrow b^-}$ . Los casos  $a = -\infty$  y  $b = \infty$  también se verifican.

## Segunda regla de L'Hospital

Supongamos que las funciones  $f$  y  $g$  son diferenciables en  $(a, b)$  y que  $g'(x) \neq 0$  en dicho intervalo. Si para  $a < x_0 < b$

(i)  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \pm \infty$  y


(ii)  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L,$

entonces


$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

## III. Reglas de L'Hospital

- La segunda regla de L'Hospital permite evaluar cualquier límite del tipo  $[\infty/\infty]$  (aunque estrictamente hablando puede aplicarse a indeterminaciones del tipo  $[k/\infty]$ , no hay caso en hacer esto si  $k$  no es  $\infty$ , pues de ser así el límite es obviamente 0).
- Al igual que la primera regla de L'Hospital, esta regla puede aplicarse por etapas.
- El teorema se cumple también para  $\lim_{x \rightarrow a^+}$  y  $\lim_{x \rightarrow b^-}$ . Los casos  $a = -\infty$  y  $b = \infty$  también se verifican.



## III. Reglas de L'Hospital



### Segunda regla de L'Hospital

Supongamos que las funciones  $f$  y  $g$  son diferenciables en  $(a, b)$  y que  $g'(x) \neq 0$  en dicho intervalo. Si para  $a < x_0 < b$

(i)  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \pm \infty$  y


(ii)  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$ ,

entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

- La segunda regla de L'Hospital permite evaluar cualquier límite del tipo  $[\infty/\infty]$  (aunque estrictamente hablando puede aplicarse a indeterminaciones del tipo  $[k/\infty]$ , no hay caso en hacer esto si  $k$  no es  $\infty$ , pues de ser así el límite es obviamente 0).
- Al igual que la primera regla de L'Hospital, esta regla puede aplicarse por etapas.
- El teorema se cumple también para  $\lim_{x \rightarrow a^+}$  y  $\lim_{x \rightarrow b^-}$ . Los casos  $a = -\infty$  y  $b = \infty$  también se verifican.

## III. Reglas de L'Hospital



### Segunda regla de L'Hospital

Supongamos que las funciones  $f$  y  $g$  son diferenciables en  $(a, b)$  y que  $g'(x) \neq 0$  en dicho intervalo. Si para  $a < x_0 < b$

(i)  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \pm \infty$  y

(ii)  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$ ,

entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

- La segunda regla de L'Hospital permite evaluar cualquier límite del tipo  $[\infty/\infty]$  (aunque estrictamente hablando puede aplicarse a indeterminaciones del tipo  $[k/\infty]$ , no hay caso en hacer esto si  $k$  no es  $\infty$ , pues de ser así el límite es obviamente 0).
- Al igual que la primera regla de L'Hospital, esta regla puede aplicarse por etapas.
- El teorema se cumple también para  $\lim_{x \rightarrow a^+}$  y  $\lim_{x \rightarrow b^-}$ . Los casos  $a = -\infty$  y  $b = \infty$  también se verifican.



## Segunda regla de L'Hospital

Supongamos que las funciones  $f$  y  $g$  son diferenciables en  $(a, b)$  y que  $g'(x) \neq 0$  en dicho intervalo. Si para  $a < x_0 < b$

(i)  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \pm \infty$  y


(ii)  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L,$

entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

## III. Reglas de L'Hospital

- La segunda regla de L'Hospital permite evaluar cualquier límite del tipo  $[\infty/\infty]$  (aunque estrictamente hablando puede aplicarse a indeterminaciones del tipo  $[k/\infty]$ , no hay caso en hacer esto si  $k$  no es  $\infty$ , pues de ser así el límite es obviamente 0).
- Al igual que la primera regla de L'Hospital, esta regla puede aplicarse por etapas.
- El teorema se cumple también para  $\lim_{x \rightarrow a^+}$  y  $\lim_{x \rightarrow b^-}$ . Los casos  $a = -\infty$  y  $b = \infty$  también se verifican.



## Segunda regla de L'Hospital

Supongamos que las funciones  $f$  y  $g$  son diferenciables en  $(a, b)$  y que  $g'(x) \neq 0$  en dicho intervalo. Si para  $a < x_0 < b$


(i)  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \pm \infty$  y

(ii)  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L,$

entonces


$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

## III. Reglas de L'Hospital



- La segunda regla de L'Hospital permite evaluar cualquier límite del tipo  $[\infty/\infty]$  (aunque estrictamente hablando puede aplicarse a indeterminaciones del tipo  $[k/\infty]$ , no hay caso en hacer esto si  $k$  no es  $\infty$ , pues de ser así el límite es obviamente 0).
- Al igual que la primera regla de L'Hospital, esta regla puede aplicarse por etapas.
- El teorema se cumple también para  $\lim_{x \rightarrow a^+}$  y  $\lim_{x \rightarrow b^-}$ . Los casos  $a = -\infty$  y  $b = \infty$  también se verifican.

## III. Reglas de L'Hospital



### Segunda regla de L'Hospital

Supongamos que las funciones  $f$  y  $g$  son diferenciables en  $(a, b)$  y que  $g'(x) \neq 0$  en dicho intervalo. Si para  $a < x_0 < b$

(i)  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \pm \infty$  y


(ii)  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$ ,

entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

- La segunda regla de L'Hospital permite evaluar cualquier límite del tipo  $[\infty/\infty]$  (aunque estrictamente hablando puede aplicarse a indeterminaciones del tipo  $[k/\infty]$ , no hay caso en hacer esto si  $k$  no es  $\infty$ , pues de ser así el límite es obviamente 0).
- Al igual que la primera regla de L'Hospital, esta regla puede aplicarse por etapas.
- El teorema se cumple también para  $\lim_{x \rightarrow a^+}$  y  $\lim_{x \rightarrow b^-}$ . Los casos  $a = -\infty$  y  $b = \infty$  también se verifican.

## III. Reglas de L'Hospital



### Segunda regla de L'Hospital

Supongamos que las funciones  $f$  y  $g$  son diferenciables en  $(a, b)$  y que  $g'(x) \neq 0$  en dicho intervalo. Si para  $a < x_0 < b$

(i)  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \pm \infty$  y

(ii)  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$ ,

entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

- La segunda regla de L'Hospital permite evaluar cualquier límite del tipo  $[\infty/\infty]$  (aunque estrictamente hablando puede aplicarse a indeterminaciones del tipo  $[k/\infty]$ , no hay caso en hacer esto si  $k$  no es  $\infty$ , pues de ser así el límite es obviamente 0).
- Al igual que la primera regla de L'Hospital, esta regla puede aplicarse por etapas.
- El teorema se cumple también para  $\lim_{x \rightarrow a^+}$  y  $\lim_{x \rightarrow b^-}$ . Los casos  $a = -\infty$  y  $b = \infty$  también se verifican.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} e^x \ln(1 + e^{-x})$$

### III. Reglas de L'Hospital

- La función que se mostró al inicio de la sesión era  $h(x) = e^x \ln(1 + e^{-x})$ . Al calcular el límite de  $h$  cuando  $x$  tiende a  $\infty$  se tiene una forma indeterminada, pero del tipo  $[\infty \cdot 0]$ , ya que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} = 0, \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \ln(1 + e^{-x}) = 0.$$

A esta forma indeterminada no puede aplicarse directamente ninguna de las reglas de L'Hospital.

- Sin embargo, al expresar

$$h(x) = e^x \ln(1 + e^{-x}) \text{ como } h(x) = \frac{\ln(1 + e^{-x})}{\frac{1}{e^x}}$$

se obtiene una forma indeterminada del tipo  $[0/0]$ .


- Al aplicar la primera regla de L'Hospital y simplificar, se obtiene que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x \ln(1 + e^{-x}) = 1.$$


# III. Reglas de L'Hospital

## Ejemplo 1

$$\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} e^x \ln(1 + e^{-x})$$



## III. Reglas de L'Hospital



- La función que se mostró al inicio de la sesión era  $h(x) = e^x \ln(1 + e^{-x})$ . Al calcular el límite de  $h$  cuando  $x$  tiende a  $\infty$  se tiene una forma indeterminada, pero del tipo  $[\infty \cdot 0]$ , ya que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} = 0, \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \ln(1 + e^{-x}) = 0.$$

A esta forma indeterminada no puede aplicarse directamente ninguna de las reglas de L'Hospital.

- Sin embargo, al expresar

$$h(x) = e^x \ln(1 + e^{-x}) \text{ como } h(x) = \frac{\ln(1 + e^{-x})}{\frac{1}{e^x}}$$

se obtiene una forma indeterminada del tipo  $[0/0]$ .


- Al aplicar la primera regla de L'Hospital y simplificar, se obtiene que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x \ln(1 + e^{-x}) = 1.$$

# III. Reglas de L'Hospital

## Ejemplo 1

$$\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} e^x \ln(1 + e^{-x})$$



$x$

■  $e^x$

■  $e^{-x}$

■  $\ln(x)$

2016-03-15


Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 48 de 88

## III. Reglas de L'Hospital

III. Reglas de L'Hospital

Ejemplo 1

$$\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} e^x \ln(1 + e^{-x})$$



- La función que se mostró al inicio de la sesión era  $h(x) = e^x \ln(1 + e^{-x})$ . Al calcular el límite de  $h$  cuando  $x$  tiende a  $\infty$  se tiene una forma indeterminada, pero del tipo  $[\infty \cdot 0]$ , ya que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} = 0, \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \ln(1 + e^{-x}) = 0.$$

A esta forma indeterminada no puede aplicarse directamente ninguna de las reglas de L'Hospital.

- Sin embargo, al expresar

$$h(x) = e^x \ln(1 + e^{-x}) \text{ como } h(x) = \frac{\ln(1 + e^{-x})}{\frac{1}{e^x}}$$

se obtiene una forma indeterminada del tipo  $[0/0]$ .


- Al aplicar la primera regla de L'Hospital y simplificar, se obtiene que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x \ln(1 + e^{-x}) = 1.$$

# III. Reglas de L'Hospital

## Ejemplo 1

$$\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} e^x \ln(1 + e^{-x})$$



$x$

■  $e^x$

■  $e^{-x}$

■  $\ln(x)$


Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 49 de 88

2016-03-15

## III. Reglas de L'Hospital

III. Reglas de L'Hospital

Ejemplo 1



- La función que se mostró al inicio de la sesión era  $h(x) = e^x \ln(1 + e^{-x})$ . Al calcular el límite de  $h$  cuando  $x$  tiende a  $\infty$  se tiene una forma indeterminada, pero del tipo  $[\infty \cdot 0]$ , ya que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} = 0, \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \ln(1 + e^{-x}) = 0.$$

A esta forma indeterminada no puede aplicarse directamente ninguna de las reglas de L'Hospital.

- Sin embargo, al expresar

$$h(x) = e^x \ln(1 + e^{-x}) \text{ como } h(x) = \frac{\ln(1 + e^{-x})}{\frac{1}{e^x}}$$


se obtiene una forma indeterminada del tipo  $[0/0]$ .

- Al aplicar la primera regla de L'Hospital y simplificar, se obtiene que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x \ln(1 + e^{-x}) = 1.$$



$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} h(x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} e^x \ln(1 + e^{-x}) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + e^{-x})}{\frac{1}{e^x}} \end{aligned}$$



$x$


■  $e^x$

■  $e^{-x}$

■  $\ln(x)$

## III. Reglas de L'Hospital

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} h(x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} e^x \ln(1 + e^{-x}) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + e^{-x})}{\frac{1}{e^x}} \end{aligned}$$



- La función que se mostró al inicio de la sesión era  $h(x) = e^x \ln(1 + e^{-x})$ . Al calcular el límite de  $h$  cuando  $x$  tiende a  $\infty$  se tiene una forma indeterminada, pero del tipo  $[\infty \cdot 0]$ , ya que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} = 0, \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \ln(1 + e^{-x}) = 0.$$

A esta forma indeterminada no puede aplicarse directamente ninguna de las reglas de L'Hospital.

- Sin embargo, al expresar


$$h(x) = e^x \ln(1 + e^{-x}) \text{ como } h(x) = \frac{\ln(1 + e^{-x})}{\frac{1}{e^x}}$$

se obtiene una forma indeterminada del tipo  $[0/0]$ .

- Al aplicar la primera regla de L'Hospital y simplificar, se obtiene que


$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x \ln(1 + e^{-x}) = 1.$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} h(x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} e^x \ln(1 + e^{-x}) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + e^{-x})}{\frac{1}{e^x}} \end{aligned}$$



■  $e^x$   
■  $e^{-x}$   
■  $\ln(x)$

### III. Reglas de L'Hospital



- La función que se mostró al inicio de la sesión era  $h(x) = e^x \ln(1 + e^{-x})$ . Al calcular el límite de  $h$  cuando  $x$  tiende a  $\infty$  se tiene una forma indeterminada, pero del tipo  $[\infty \cdot 0]$ , ya que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} = 0, \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \ln(1 + e^{-x}) = 0.$$

A esta forma indeterminada no puede aplicarse directamente ninguna de las reglas de L'Hospital.

- Sin embargo, al expresar


$$h(x) = e^x \ln(1 + e^{-x}) \text{ como } h(x) = \frac{\ln(1 + e^{-x})}{\frac{1}{e^x}}$$

se obtiene una forma indeterminada del tipo  $[0/0]$ .

- Al aplicar la primera regla de L'Hospital y simplificar, se obtiene que


$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x \ln(1 + e^{-x}) = 1.$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} h(x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} e^x \ln(1 + e^{-x}) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + e^{-x})}{\frac{1}{e^x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-\frac{1}{e^x + 1}}{-\frac{1}{e^x}} \end{aligned}$$



■  $e^x$   
■  $e^{-x}$   
■  $\ln(x)$

### III. Reglas de L'Hospital



- La función que se mostró al inicio de la sesión era  $h(x) = e^x \ln(1 + e^{-x})$ . Al calcular el límite de  $h$  cuando  $x$  tiende a  $\infty$  se tiene una forma indeterminada, pero del tipo  $[\infty \cdot 0]$ , ya que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} = 0, \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \ln(1 + e^{-x}) = 0.$$

A esta forma indeterminada no puede aplicarse directamente ninguna de las reglas de L'Hospital.

- Sin embargo, al expresar

$$h(x) = e^x \ln(1 + e^{-x}) \text{ como } h(x) = \frac{\ln(1 + e^{-x})}{\frac{1}{e^x}}$$

se obtiene una forma indeterminada del tipo  $[0/0]$ .


- Al aplicar la primera regla de L'Hospital y simplificar, se obtiene que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x \ln(1 + e^{-x}) = 1.$$

# III. Reglas de L'Hospital

## Ejemplo 1

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} e^x \ln(1 + e^{-x}) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + e^{-x})}{\frac{1}{e^x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-\frac{1}{e^x + 1}}{-\frac{1}{e^x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{e^x + 1}\end{aligned}$$



■  $e^x$   
■  $e^{-x}$   
■  $\ln(x)$


Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 53 de 88

2016-03-15

## III. Reglas de L'Hospital

III. Reglas de L'Hospital

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} e^x \ln(1 + e^{-x}) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + e^{-x})}{\frac{1}{e^x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-\frac{1}{e^x + 1}}{-\frac{1}{e^x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{e^x + 1}\end{aligned}$$



- La función que se mostró al inicio de la sesión era  $h(x) = e^x \ln(1 + e^{-x})$ . Al calcular el límite de  $h$  cuando  $x$  tiende a  $\infty$  se tiene una forma indeterminada, pero del tipo  $[\infty \cdot 0]$ , ya que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} = 0, \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \ln(1 + e^{-x}) = 0.$$

A esta forma indeterminada no puede aplicarse directamente ninguna de las reglas de L'Hospital.

- Sin embargo, al expresar

$$h(x) = e^x \ln(1 + e^{-x}) \text{ como } h(x) = \frac{\ln(1 + e^{-x})}{\frac{1}{e^x}}$$

se obtiene una forma indeterminada del tipo  $[0/0]$ .


- Al aplicar la primera regla de L'Hospital y simplificar, se obtiene que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x \ln(1 + e^{-x}) = 1.$$

# III. Reglas de L'Hospital

## Ejemplo 1

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow \infty} h(x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} e^x \ln(1 + e^{-x}) \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + e^{-x})}{\frac{1}{e^x}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-\frac{1}{e^x + 1}}{-\frac{1}{e^x}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{e^x + 1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{e^x}}
 \end{aligned}$$




■  $e^x$   
■  $e^{-x}$   
■  $\ln(x)$

2016-03-15

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 54 de 88

## III. Reglas de L'Hospital



- La función que se mostró al inicio de la sesión era  $h(x) = e^x \ln(1 + e^{-x})$ . Al calcular el límite de  $h$  cuando  $x$  tiende a  $\infty$  se tiene una forma indeterminada, pero del tipo  $[\infty \cdot 0]$ , ya que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} = 0, \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \ln(1 + e^{-x}) = 0.$$

A esta forma indeterminada no puede aplicarse directamente ninguna de las reglas de L'Hospital.

- Sin embargo, al expresar

$$h(x) = e^x \ln(1 + e^{-x}) \text{ como } h(x) = \frac{\ln(1 + e^{-x})}{\frac{1}{e^x}}$$

se obtiene una forma indeterminada del tipo  $[0/0]$ .


- Al aplicar la primera regla de L'Hospital y simplificar, se obtiene que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x \ln(1 + e^{-x}) = 1.$$

# III. Reglas de L'Hospital

## Ejemplo 1

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow \infty} h(x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} e^x \ln(1 + e^{-x}) \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + e^{-x})}{\frac{1}{e^x}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-\frac{1}{e^x + 1}}{-\frac{1}{e^x}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{e^x + 1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{e^x}} \\
 &= 1.
 \end{aligned}$$




■  $e^x$   
■  $e^{-x}$   
■  $\ln(x)$

2016-03-15

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 55 de 88

## III. Reglas de L'Hospital



- La función que se mostró al inicio de la sesión era  $h(x) = e^x \ln(1 + e^{-x})$ . Al calcular el límite de  $h$  cuando  $x$  tiende a  $\infty$  se tiene una forma indeterminada, pero del tipo  $[\infty \cdot 0]$ , ya que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} = 0, \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \ln(1 + e^{-x}) = 0.$$

A esta forma indeterminada no puede aplicarse directamente ninguna de las reglas de L'Hospital.

- Sin embargo, al expresar

$$h(x) = e^x \ln(1 + e^{-x}) \text{ como } h(x) = \frac{\ln(1 + e^{-x})}{\frac{1}{e^x}}$$

se obtiene una forma indeterminada del tipo  $[0/0]$ .


- Al aplicar la primera regla de L'Hospital y simplificar, se obtiene que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x \ln(1 + e^{-x}) = 1.$$

# III. Reglas de L'Hospital

## Ejemplo 1

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} e^x \ln(1 + e^{-x}) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + e^{-x})}{\frac{1}{e^x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-\frac{1}{e^x + 1}}{-\frac{1}{e^x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{e^x + 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{e^x}} \\ &= 1.\end{aligned}$$




■  $e^x$   
■  $e^{-x}$   
■  $\ln(x)$

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 56 de 88

2016-03-15

## III. Reglas de L'Hospital



- La función que se mostró al inicio de la sesión era  $h(x) = e^x \ln(1 + e^{-x})$ . Al calcular el límite de  $h$  cuando  $x$  tiende a  $\infty$  se tiene una forma indeterminada, pero del tipo  $[\infty \cdot 0]$ , ya que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} = 0, \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \ln(1 + e^{-x}) = 0.$$

A esta forma indeterminada no puede aplicarse directamente ninguna de las reglas de L'Hospital.

- Sin embargo, al expresar

$$h(x) = e^x \ln(1 + e^{-x}) \text{ como } h(x) = \frac{\ln(1 + e^{-x})}{\frac{1}{e^x}}$$

se obtiene una forma indeterminada del tipo  $[0/0]$ .


- Al aplicar la primera regla de L'Hospital y simplificar, se obtiene que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x \ln(1 + e^{-x}) = 1.$$

# III. Reglas de L'Hospital

## Ejemplo 2

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x \ln(1 + e^{-x})$$



■  $e^x$   
■  $e^{-x}$   
■  $\ln(x)$

2016-03-15


Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 57 de 88

## III. Reglas de L'Hospital

III. Reglas de L'Hospital

Ejemplo 2

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x \ln(1 + e^{-x})$$




- De manera similar puede obtenerse el límite de  $h$  cuando  $x$  tiende a  $-\infty$ .
- Puesto que el límite de  $e^{-x}$  es  $\infty$  cuando  $x$  tiende a  $-\infty$ , en este caso el límite de  $h$  es igual con cero.



# III. Reglas de L'Hospital

## Ejemplo 2

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x \ln(1 + e^{-x}) \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(1 + e^{-x})}{\frac{1}{e^x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-\frac{1}{e^x + 1}}{-\frac{1}{e^x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{e^x + 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{e^x}}\end{aligned}$$



■  $e^x$   
■  $e^{-x}$   
■  $\ln(x)$

2016-03-15


Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 58 de 88

## III. Reglas de L'Hospital

III. Reglas de L'Hospital

Ejemplo 2

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x \ln(1 + e^{-x}) \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(1 + e^{-x})}{\frac{1}{e^x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-\frac{1}{e^x + 1}}{-\frac{1}{e^x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{e^x + 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{e^x}}\end{aligned}$$




- De manera similar puede obtenerse el límite de  $h$  cuando  $x$  tiende a  $-\infty$ .
- Puesto que el límite de  $e^{-x}$  es  $\infty$  cuando  $x$  tiende a  $-\infty$ , en este caso el límite de  $h$  es igual con cero.

# III. Reglas de L'Hospital

## Ejemplo 2

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x \ln(1 + e^{-x}) \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(1 + e^{-x})}{\frac{1}{e^x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-\frac{1}{e^x + 1}}{-\frac{1}{e^x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{e^x + 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{e^x}} \\ &= 0.\end{aligned}$$



■  $e^x$   
■  $e^{-x}$   
■  $\ln(x)$


2016-03-15

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 59 de 88

## III. Reglas de L'Hospital

- De manera similar puede obtenerse el límite de  $h$  cuando  $x$  tiende a  $-\infty$ .
- Puesto que el límite de  $e^{-x}$  es  $\infty$  cuando  $x$  tiende a  $-\infty$ , en este caso el límite de  $h$  es igual con cero.


$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x \ln(1 + e^{-x}) \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(1 + e^{-x})}{\frac{1}{e^x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-\frac{1}{e^x + 1}}{-\frac{1}{e^x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{e^x + 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{e^x}} \\ &= 0.\end{aligned}$$



# III. Reglas de L'Hospital

## Ejemplo 2

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x \ln(1 + e^{-x}) \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(1 + e^{-x})}{\frac{1}{e^x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-\frac{1}{e^x + 1}}{-\frac{1}{e^x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{e^x + 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{e^x}} \\ &= 0.\end{aligned}$$



■  $e^x$   
■  $e^{-x}$   
■  $\ln(x)$

2016-03-15


Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 60 de 88

## III. Reglas de L'Hospital

III. Reglas de L'Hospital

Ejemplo 2

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x \ln(1 + e^{-x}) \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(1 + e^{-x})}{\frac{1}{e^x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-\frac{1}{e^x + 1}}{-\frac{1}{e^x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{e^x + 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{e^x}} \\ &= 0.\end{aligned}$$



- De manera similar puede obtenerse el límite de  $h$  cuando  $x$  tiende a  $-\infty$ .
- Puesto que el límite de  $e^{-x}$  es  $\infty$  cuando  $x$  tiende a  $-\infty$ , en este caso el límite de  $h$  es igual con cero.

## Teorema de Taylor

Si la derivada de orden  $n + 1$  de una función  $f$ ,  $f^{(n+1)}(t)$ , existe para toda  $t$  en un intervalo que contiene a  $a$  y  $x$ , y si

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n,$$

entonces el error  $E(x) = f(x) - P_n(x)$  en la aproximación  $f(x) \approx P_n(x)$  está dado por

$$E_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(s)}{(n+1)!}(x - a)^{n+1},$$

donde  $s \in (a, x)$ .

## IV. Fórmula de Taylor

- Un polinomio  $P_n(x)$  que es igual a una función  $f(x)$  y a sus primeras  $n$  derivadas en  $x = a$ , describe a  $f(x)$  cerca de  $a$  mejor que cualquier otro polinomio de grado a lo más  $n$ .
- A este polinomio se le conoce como *polinomio de Taylor*.
- El Teorema de Taylor provee una fórmula para calcular el error cometido al aproximar a una función  $f(x)$  por medio de un polinomio de Taylor de grado  $n$ .
- A esta forma de expresar el error se le llama *residuo de Lagrange*.
- La demostración del teorema hace uso del teorema del valor medio.

## Teorema de Taylor

Si la derivada de orden  $n + 1$  de una función  $f$ ,  $f^{(n+1)}(t)$ , existe para toda  $t$  en un intervalo que contiene a  $a$  y  $x$ , y si

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n.$$

entonces el error  $E(x) = f(x) - P_n(x)$  en la aproximación  $f(x) \approx P_n(x)$  está dado por

$$E_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(s)}{(n+1)!}(x - a)^{n+1},$$

donde  $s \in (a, x)$ .

$$f(x) = P_n(x) + E_n(x)$$

## IV. Fórmula de Taylor

- El error en la fórmula de Taylor es, cerca de  $a$ , proporcional a  $(x - a)^{n+1}$ , lo cual puede escribirse mediante la notación «O grande» en esta forma.
- Por ejemplo, si el polinomio de Taylor se construye alrededor de  $a = 0$  (en cuyo caso se llama *polinomio de MacLaurin*), la fórmula de Taylor para la función  $\ln(1 + x)$  con el error escrito con notación «O grande» es esta.
- Si se empleara un polinomio de grado uno en esta fórmula,  $\ln(1 + x)$  quedaría expresada de este modo.

$$\begin{aligned} f(x) &= P_n(x) + E_n(x) \\ &= P_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(s)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1} \end{aligned}$$

## IV. Fórmula de Taylor

- El error en la fórmula de Taylor es, cerca de  $a$ , proporcional a  $(x-a)^{n+1}$ , lo cual puede escribirse mediante la notación «O grande» en esta forma.
- Por ejemplo, si el polinomio de Taylor se construye alrededor de  $a=0$  (en cuyo caso se llama *polinomio de MacLaurin*), la fórmula de Taylor para la función  $\ln(1+x)$  con el error escrito con notación «O grande» es esta.
- Si se empleara un polinomio de grado uno en esta fórmula,  $\ln(1+x)$  quedaría expresada de este modo.

$$\begin{aligned} f(x) &= P_n(x) + E_n(x) \\ &= P_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(s)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1} \end{aligned}$$

# IV. Fórmula de Taylor

Notación «O grande»

$$\begin{aligned} f(x) &= P_n(x) + E_n(x) \\ &= P_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(s)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1} \end{aligned}$$

2016-03-15

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 64 de 88

## IV. Fórmula de Taylor

- El error en la fórmula de Taylor es, cerca de  $a$ , proporcional a  $(x-a)^{n+1}$ , lo cual puede escribirse mediante la notación «O grande» en esta forma.
- Por ejemplo, si el polinomio de Taylor se construye alrededor de  $a=0$  (en cuyo caso se llama *polinomio de MacLaurin*), la fórmula de Taylor para la función  $\ln(1+x)$  con el error escrito con notación «O grande» es esta.
- Si se empleara un polinomio de grado uno en esta fórmula,  $\ln(1+x)$  quedaría expresada de este modo.

$$\begin{aligned} f(x) &= P_n(x) + E_n(x) \\ &= P_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(s)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f(x) &= P_n(x) + E_n(x) \\
 &= P_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(s)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1} \\
 &= P_n(x) + O\left((x-a)^{n+1}\right).
 \end{aligned}$$

## IV. Fórmula de Taylor

$$\begin{aligned}
 f(x) &= P_n(x) + E_n(x) \\
 &= P_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(s)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1} \\
 &= P_n(x) + O\left((x-a)^{n+1}\right).
 \end{aligned}$$

- El error en la fórmula de Taylor es, cerca de  $a$ , proporcional a  $(x-a)^{n+1}$ , lo cual puede escribirse mediante la notación «O grande» en esta forma.
- Por ejemplo, si el polinomio de Taylor se construye alrededor de  $a=0$  (en cuyo caso se llama *polinomio de MacLaurin*), la fórmula de Taylor para la función  $\ln(1+x)$  con el error escrito con notación «O grande» es esta.
- Si se empleara un polinomio de grado uno en esta fórmula,  $\ln(1+x)$  quedaría expresada de este modo.



# IV. Fórmula de Taylor

Notación «O grande»

$$\begin{aligned}f(x) &= P_n(x) + E_n(x) \\&= P_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(s)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1} \\&= P_n(x) + O\left((x-a)^{n+1}\right).\end{aligned}$$

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 66 de 88

2016-03-15

## IV. Fórmula de Taylor

IV. Fórmula de Taylor

Notación «O grande»

$$\begin{aligned}f(x) &= P_n(x) + E_n(x) \\&= P_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(s)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1} \\&= P_n(x) + O\left((x-a)^{n+1}\right).\end{aligned}$$

- El error en la fórmula de Taylor es, cerca de  $a$ , proporcional a  $(x-a)^{n+1}$ , lo cual puede escribirse mediante la notación «O grande» en esta forma.
- Por ejemplo, si el polinomio de Taylor se construye alrededor de  $a=0$  (en cuyo caso se llama *polinomio de MacLaurin*), la fórmula de Taylor para la función  $\ln(1+x)$  con el error escrito con notación «O grande» es esta.
- Si se empleara un polinomio de grado uno en esta fórmula,  $\ln(1+x)$  quedaría expresada de este modo.

# IV. Fórmula de Taylor

Notación «O grande»

$$\begin{aligned}f(x) &= P_n(x) + E_n(x) \\ &= P_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(s)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1} \\ &= P_n(x) + O\left((x-a)^{n+1}\right).\end{aligned}$$

**Ejemplo:** Si  $a = 0$ :

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + O(x^{n+1}).$$

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 67 de 88

2016-03-15

## IV. Fórmula de Taylor

IV. Fórmula de Taylor

Notación «O grande»

$$\begin{aligned}f(x) &= P_n(x) + E_n(x) \\ &= P_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(s)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1} \\ &= P_n(x) + O\left((x-a)^{n+1}\right).\end{aligned}$$

**Ejemplo:** Si  $a = 0$ :

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + O(x^{n+1}).$$

- El error en la fórmula de Taylor es, cerca de  $a$ , proporcional a  $(x-a)^{n+1}$ , lo cual puede escribirse mediante la notación «O grande» en esta forma.
- Por ejemplo, si el polinomio de Taylor se construye alrededor de  $a = 0$  (en cuyo caso se llama *polinomio de MacLaurin*), la fórmula de Taylor para la función  $\ln(1+x)$  con el error escrito con notación «O grande» es esta.
- Si se empleara un polinomio de grado uno en esta fórmula,  $\ln(1+x)$  quedaría expresada de este modo.

# IV. Fórmula de Taylor

Notación «O grande»

$$\begin{aligned}f(x) &= P_n(x) + E_n(x) \\ &= P_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(s)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1} \\ &= P_n(x) + O\left((x-a)^{n+1}\right).\end{aligned}$$

**Ejemplo:** Si  $a = 0$ :

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + O(x^{n+1}).$$

Y para  $n = 1$ :

$$\ln(1+x) = x + O(x^2).$$

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 68 de 88

## IV. Fórmula de Taylor

- El error en la fórmula de Taylor es, cerca de  $a$ , proporcional a  $(x-a)^{n+1}$ , lo cual puede escribirse mediante la notación «O grande» en esta forma.
- Por ejemplo, si el polinomio de Taylor se construye alrededor de  $a = 0$  (en cuyo caso se llama *polinomio de MacLaurin*), la fórmula de Taylor para la función  $\ln(1+x)$  con el error escrito con notación «O grande» es esta.
- Si se empleara un polinomio de grado uno en esta fórmula,  $\ln(1+x)$  quedaría expresada de este modo.

IV. Fórmula de Taylor

Notación «O grande»

$$\begin{aligned}f(x) &= P_n(x) + E_n(x) \\ &= P_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(s)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1} \\ &= P_n(x) + O\left((x-a)^{n+1}\right).\end{aligned}$$

Ejemplo: Si  $a = 0$ :

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + O(x^{n+1}).$$

Y para  $n = 1$ :

$$\ln(1+x) = x + O(x^2).$$

# IV. Fórmula de Taylor

Notación «O grande»

$$\begin{aligned}f(x) &= P_n(x) + E_n(x) \\ &= P_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(s)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1} \\ &= P_n(x) + O\left((x-a)^{n+1}\right).\end{aligned}$$

**Ejemplo:** Si  $a = 0$ :

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + O(x^{n+1}).$$

Y para  $n = 1$ :

$$\ln(1+x) = x + O(x^2).$$

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 69 de 88

2016-03-15

## IV. Fórmula de Taylor

IV. Fórmula de Taylor

Notación «O grande»

$$\begin{aligned}f(x) &= P_n(x) + E_n(x) \\ &= P_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(s)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1} \\ &= P_n(x) + O\left((x-a)^{n+1}\right).\end{aligned}$$

**Ejemplo:** Si  $a = 0$ :

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + O(x^{n+1}).$$

Y para  $n = 1$ :

$$\ln(1+x) = x + O(x^2).$$


- El error en la fórmula de Taylor es, cerca de  $a$ , proporcional a  $(x-a)^{n+1}$ , lo cual puede escribirse mediante la notación «O grande» en esta forma.
- Por ejemplo, si el polinomio de Taylor se construye alrededor de  $a = 0$  (en cuyo caso se llama *polinomio de MacLaurin*), la fórmula de Taylor para la función  $\ln(1+x)$  con el error escrito con notación «O grande» es esta.
- Si se empleara un polinomio de grado uno en esta fórmula,  $\ln(1+x)$  quedaría expresada de este modo.

Si al calcular

$$\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} e^x \ln(1 + e^{-x}).$$

se sustituye  $t = e^{-x}$ ,  $x \rightarrow \infty$  corresponde a  $t \rightarrow 0$ :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} h(x) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t + O(t^2)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} 1 + O(t) \\ &= 1. \end{aligned}$$



## IV. Fórmula de Taylor

- La fórmula de Taylor también puede emplearse para dar tratamiento a formas indeterminadas del tipo  $[0/0]$  al evaluar límites.
- Por ejemplo, al hacer la sustitución  $t = e^{-x}$ , el límite de  $h$  cuando  $x$  tiende a  $\infty$  puede plantearse en función de  $t$ , cuando ésta tiende a 0.
- El resultado confirma el obtenido al evaluar este límite mediante la primera regla de L'Hospital.
- En este caso no puede calcularse el límite cuando  $x$  tiende a  $-\infty$  con la fórmula de Taylor ya que el polinomio está construido alrededor de 0.
- Notemos que si  $x$  tiende a  $-\infty$ ,  $t$  tendería en este caso a  $\infty$  y se obtendría una forma indeterminada del tipo  $[\infty/\infty]$  y no del tipo  $[0/0]$ .

$$\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} e^x \ln(1 + e^{-x}).$$

se sustituye  $t = e^{-x}$ ,  $x \rightarrow \infty$  corresponde a  $t \rightarrow 0$ :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} h(x) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t + O(t^2)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} 1 + O(t) \\ &= 1. \end{aligned}$$



De

$$h(x) = e^x \ln(1 + e^{-x})$$

sabemos que:

- Por medio de la primera regla de L'Hospital hemos concluido que el límite de  $h$  cuando  $x$  tiende a  $-\infty$  es 0. Asimismo, con esta regla se ha visto que el límite de  $h$  cuando  $x$  tiende a  $\infty$  es 1, resultado que se ha confirmado por medio de la fórmula de Taylor.
- Por otra parte, al evaluar a  $h$  en 0 se obtiene aproximadamente 0.7.
- Y adicionalmente, luego de aplicar el criterio de la primera derivada puede concluirse que  $h$  es creciente.
- Con toda esta información podemos hacer un rápido esbozo de la función  $h$ .

De

$$h(x) = e^x \ln(1 + e^{-x})$$

sabemos que:

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = 0.$

2016-03-15

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 72 de 88

## V. Aplicación

De  $h(x) = e^x \ln(1 + e^{-x})$   
 sabemos que:  
 •  $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = 0.$

- Por medio de la primera regla de L'Hospital hemos concluido que el límite de  $h$  cuando  $x$  tiende a  $-\infty$  es 0. Asimismo, con esta regla se ha visto que el límite de  $h$  cuando  $x$  tiende a  $\infty$  es 1, resultado que se ha confirmado por medio de la fórmula de Taylor.
- Por otra parte, al evaluar a  $h$  en 0 se obtiene aproximadamente 0.7.
- Y adicionalmente, luego de aplicar el criterio de la primera derivada puede concluirse que  $h$  es creciente.
- Con toda esta información podemos hacer un rápido esbozo de la función  $h$ .

De

$$h(x) = e^x \ln(1 + e^{-x})$$

sabemos que:

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = 0$ .
- $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = 1$ .

2016-03-15

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 73 de 88

## V. Aplicación

De  $h(x) = e^x \ln(1 + e^{-x})$

sabemos que:

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = 0$ .
- $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = 1$ .

- Por medio de la primera regla de L'Hospital hemos concluido que el límite de  $h$  cuando  $x$  tiende a  $-\infty$  es 0. Asimismo, con esta regla se ha visto que el límite de  $h$  cuando  $x$  tiende a  $\infty$  es 1, resultado que se ha confirmado por medio de la fórmula de Taylor.
- Por otra parte, al evaluar a  $h$  en 0 se obtiene aproximadamente 0.7.
- Y adicionalmente, luego de aplicar el criterio de la primera derivada puede concluirse que  $h$  es creciente.
- Con toda esta información podemos hacer un rápido esbozo de la función  $h$ .



De

$$h(x) = e^x \ln(1 + e^{-x})$$

sabemos que:

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = 0$ .
- $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = 1$ .
- $h(0) = e^0 \ln(1 + e^{-0}) = \ln(2) \approx 0.7$ .

2016-03-15

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 74 de 88

## V. Aplicación

De  $h(x) = e^x \ln(1 + e^{-x})$

sabemos que:

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = 0$ .
- $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = 1$ .
- $h(0) = e^0 \ln(1 + e^{-0}) = \ln(2) \approx 0.7$ .

- Por medio de la primera regla de L'Hospital hemos concluido que el límite de  $h$  cuando  $x$  tiende a  $-\infty$  es 0. Asimismo, con esta regla se ha visto que el límite de  $h$  cuando  $x$  tiende a  $\infty$  es 1, resultado que se ha confirmado por medio de la fórmula de Taylor.
- Por otra parte, al evaluar a  $h$  en 0 se obtiene aproximadamente 0.7.
- Y adicionalmente, luego de aplicar el criterio de la primera derivada puede concluirse que  $h$  es creciente.
- Con toda esta información podemos hacer un rápido esbozo de la función  $h$ .

De

$$h(x) = e^x \ln(1 + e^{-x})$$

sabemos que:

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = 0$ .
- $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = 1$ .
- $h(0) = e^0 \ln(1 + e^{-0}) = \ln(2) \approx 0.7$ .
- $h(x)$  es una función creciente para toda  $x$ .

2016-03-15

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 75 de 88

V. Aplicación

De  $h(x) = e^x \ln(1 + e^{-x})$

sabemos que:

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = 0$ .
- $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = 1$ .
- $h(0) = e^0 \ln(1 + e^{-0}) = \ln(2) \approx 0.7$ .
- $h(x)$  es una función creciente para toda  $x$ .

- Por medio de la primera regla de L'Hospital hemos concluido que el límite de  $h$  cuando  $x$  tiende a  $-\infty$  es 0. Asimismo, con esta regla se ha visto que el límite de  $h$  cuando  $x$  tiende a  $\infty$  es 1, resultado que se ha confirmado por medio de la fórmula de Taylor.
- Por otra parte, al evaluar a  $h$  en 0 se obtiene aproximadamente 0.7.
- Y adicionalmente, luego de aplicar el criterio de la primera derivada puede concluirse que  $h$  es creciente.
- Con toda esta información podemos hacer un rápido esbozo de la función  $h$ .

De

$$h(x) = e^x \ln(1 + e^{-x})$$

sabemos que:

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = 0$ .
- $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = 1$ .
- $h(0) = e^0 \ln(1 + e^{-0}) = \ln(2) \approx 0.7$ .
- $h(x)$  es una función creciente para toda  $x$ .

2016-03-15

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 76 de 88

V. Aplicación

De  $h(x) = e^x \ln(1 + e^{-x})$


sabemos que:

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = 0$ .
- $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = 1$ .
- $h(0) = e^0 \ln(1 + e^{-0}) = \ln(2) \approx 0.7$ .
- $h(x)$  es una función creciente para toda  $x$ .

- Por medio de la primera regla de L'Hospital hemos concluido que el límite de  $h$  cuando  $x$  tiende a  $-\infty$  es 0. Asimismo, con esta regla se ha visto que el límite de  $h$  cuando  $x$  tiende a  $\infty$  es 1, resultado que se ha confirmado por medio de la fórmula de Taylor.
- Por otra parte, al evaluar a  $h$  en 0 se obtiene aproximadamente 0.7.
- Y adicionalmente, luego de aplicar el criterio de la primera derivada puede concluirse que  $h$  es creciente.
- Con toda esta información podemos hacer un rápido esbozo de la función  $h$ .

# V. Aplicación

Regla de L'Hospital y fórmula de Taylor




2016-03-15

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 77 de 88

V. Aplicación

V. Aplicación

Regla de L'Hospital y fórmula de Taylor



Pero, por medio del software Maxima se obtiene la siguiente gráfica para la función  $h(x) = e^x \ln(1 + e^{-x})$ ... ¡Esto desafía el análisis que acabamos de realizar!

- Claramente la gráfica es incorrecta.
- Cambiar de software no solucionaría el problema puesto que todo software depende de la representación de punto flotante con que las computadoras manejan a los números reales.
- Cambiar de equipo de cómputo tampoco resolvería el problema, pues toda computadora es capaz de representar sólo a un subconjunto del conjunto de los números reales debido a la densidad de éstos.
- El error en la gráfica es provocado por esta limitante.

# V. Aplicación

Regla de L'Hospital y fórmula de Taylor



2016-03-15

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 78 de 88


V. Aplicación

V. Aplicación



¡Sí! ¡A veces las computadoras se equivocan!

- Si la gráfica se requiriera para una tarea, tendríamos una mala nota;
- si se requiriera en un examen, probablemente reprobaríamos la materia;
- si una decisión corporativa estuviera basada en esa gráfica, podría haber consecuencias negativas para la compañía y quizá podríamos perder nuestro empleo;
- y si una decisión para el desarrollo nacional se basara en esa gráfica, podría impactar nuestro entorno de forma insospechada.



2016-03-15

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 79 de 88


V. Aplicación



- ¿Cómo habríamos podido determinar que la gráfica es incorrecta sin haber hecho el análisis previo? ¡Sin éste no habría manera de saberlo!
- Por ello es importante cobrar conciencia del poder de las matemáticas, en este caso del cálculo diferencial.
- No se trata de no usar software. Se trata de aprovecharlo, pero también de emplearlo con cautela.

# V. Aplicación


Regla de L'Hospital y fórmula de Taylor



2016-03-15


Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 80 de 88

V. Aplicación



# V. Aplicación

Regla de L'Hospital y fórmula de Taylor



2016-03-15

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 81 de 88

V. Aplicación

V. Aplicación  
Regla de L'Hospital y fórmula de Taylor





# VI. Conclusiones

## Regla de L'Hospital y fórmula de Taylor

- Las reglas de L'Hospital pueden emplearse sólo en indeterminaciones del tipo  $[0/0]$  o  $[\infty/\infty]$ .

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 82 de 88

2016-03-15

## VI. Conclusiones

VI. Conclusiones

Regla de L'Hospital y fórmula de Taylor

Las reglas de L'Hospital pueden emplearse sólo en indeterminaciones del tipo  $[0/0]$  o  $[\infty/\infty]$ .

Tres cosas que no hay que olvidar... Bueno, cuatro:

- Las reglas de L'Hospital pueden emplearse sólo para tratar indeterminaciones del tipo  $[0/0]$  o  $[\infty/\infty]$ . *Si se emplean para evaluar límites que no son indeterminados, generalmente se llegará a falsas conclusiones.*
- Si  $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)/g'(x)$  no existe, no es posible establecer el valor de  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)/g(x)$  por medio de las reglas de L'Hospital. *En tal caso es necesario emplear otras técnicas, como el teorema del emparedado.*
- La fórmula de Taylor puede emplearse para aproximar una función y también para evaluar límites y *dar tratamiento a formas indeterminadas del tipo  $[0/0]$ .*
- Los resultados obtenidos por medio de una computadora deben validarse bajo el rigor de las matemáticas, *en este caso particular, bajo el rigor del cálculo diferencial.*

# VI. Conclusiones

## Regla de L'Hospital y fórmula de Taylor

- Las reglas de L'Hospital pueden emplearse sólo en indeterminaciones del tipo  $[0/0]$  o  $[\infty/\infty]$ .
- Si  $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)/g'(x)$  no existe, no es posible aplicar las reglas de L'Hospital.

2016-03-15  
Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 83 de 88

## VI. Conclusiones

Tres cosas que no hay que olvidar... Bueno, cuatro:

- Las reglas de L'Hospital pueden emplearse sólo para tratar indeterminaciones del tipo  $[0/0]$  o  $[\infty/\infty]$ . *Si se emplean para evaluar límites que no son indeterminados, generalmente se llegará a falsas conclusiones.*
- Si  $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)/g'(x)$  no existe, no es posible establecer el valor de  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)/g(x)$  por medio de las reglas de L'Hospital. *En tal caso es necesario emplear otras técnicas, como el teorema del emparedado.*
- La fórmula de Taylor puede emplearse para aproximar una función y también para evaluar límites y *dar tratamiento a formas indeterminadas del tipo  $[0/0]$ .*
- Los resultados obtenidos por medio de una computadora deben validarse bajo el rigor de las matemáticas, *en este caso particular, bajo el rigor del cálculo diferencial.*

- Las reglas de L'Hospital pueden emplearse sólo en indeterminaciones del tipo  $[0/0]$  o  $[\infty/\infty]$ .
- Si  $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)/g'(x)$  no existe, no es posible aplicar las reglas de L'Hospital.

# VI. Conclusiones

## Regla de L'Hospital y fórmula de Taylor

- Las reglas de L'Hospital pueden emplearse sólo en indeterminaciones del tipo  $[0/0]$  o  $[\infty/\infty]$ .
- Si  $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)/g'(x)$  no existe, no es posible aplicar las reglas de L'Hospital.
- La fórmula de Taylor puede emplearse para aproximar una función, pero también para evaluar límites del tipo  $[0/0]$ .

2016-03-15  
Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 84 de 88

## VI. Conclusiones

Tres cosas que no hay que olvidar... Bueno, cuatro:

- Las reglas de L'Hospital pueden emplearse sólo para tratar indeterminaciones del tipo  $[0/0]$  o  $[\infty/\infty]$ . *Si se emplean para evaluar límites que no son indeterminados, generalmente se llegará a falsas conclusiones.*
- Si  $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)/g'(x)$  no existe, no es posible establecer el valor de  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)/g(x)$  por medio de las reglas de L'Hospital. *En tal caso es necesario emplear otras técnicas, como el teorema del emparedado.*
- La fórmula de Taylor puede emplearse para aproximar una función y también para evaluar límites y *dar tratamiento a formas indeterminadas del tipo  $[0/0]$ .*
- Los resultados obtenidos por medio de una computadora deben validarse bajo el rigor de las matemáticas, *en este caso particular, bajo el rigor del cálculo diferencial.*

- Las reglas de L'Hospital pueden emplearse sólo en indeterminaciones del tipo  $[0/0]$  o  $[\infty/\infty]$ .
- Si  $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)/g'(x)$  no existe, no es posible aplicar las reglas de L'Hospital.
- La fórmula de Taylor puede emplearse para aproximar una función, pero también para evaluar límites del tipo  $[0/0]$ .

# VI. Conclusiones

## Regla de L'Hospital y fórmula de Taylor

- Las reglas de L'Hospital pueden emplearse sólo en indeterminaciones del tipo  $[0/0]$  o  $[\infty/\infty]$ .
- Si  $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)/g'(x)$  no existe, no es posible aplicar las reglas de L'Hospital.
- La fórmula de Taylor puede emplearse para aproximar una función, pero también para evaluar límites del tipo  $[0/0]$ .
- Los resultados obtenidos por medio de una computadora deben validarse bajo el rigor de las matemáticas.

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 85 de 88

2016-03-15

## VI. Conclusiones

Tres cosas que no hay que olvidar... Bueno, cuatro:

- Las reglas de L'Hospital pueden emplearse sólo para tratar indeterminaciones del tipo  $[0/0]$  o  $[\infty/\infty]$ . *Si se emplean para evaluar límites que no son indeterminados, generalmente se llegará a falsas conclusiones.*
- Si  $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)/g'(x)$  no existe, no es posible establecer el valor de  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)/g(x)$  por medio de las reglas de L'Hospital. *En tal caso es necesario emplear otras técnicas, como el teorema del emparedado.*
- La fórmula de Taylor puede emplearse para aproximar una función y también para evaluar límites y *dar tratamiento a formas indeterminadas del tipo  $[0/0]$ .*
- Los resultados obtenidos por medio de una computadora deben validarse bajo el rigor de las matemáticas, *en este caso particular, bajo el rigor del cálculo diferencial.*

- Las reglas de L'Hospital pueden emplearse sólo en indeterminaciones del tipo  $[0/0]$  o  $[\infty/\infty]$ .
- Si  $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)/g'(x)$  no existe, no es posible aplicar las reglas de L'Hospital.
- La fórmula de Taylor puede emplearse para aproximar una función, pero también para evaluar límites del tipo  $[0/0]$ .
- Los resultados obtenidos por medio de una computadora deben validarse bajo el rigor de las matemáticas.

## VII. Recursos complementarios

Regla de L'Hospital y fórmula de Taylor



Reglas de L'Hospital: [bit.ly/1XrCFT0](http://bit.ly/1XrCFT0)

Fórmula de Taylor: [bit.ly/1M3G5ex](http://bit.ly/1M3G5ex)

2016-03-15

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 86 de 88


## VII. Recursos complementarios

En el sitio de Khan Academy se encuentran algunos recursos electrónicos y ejercicios interactivos complementarios sobre estos temas.



# VII. Recursos complementarios

## Regla de L'Hospital y fórmula de Taylor



<https://miespaciodeaprendizaje.moodlecloud.com>



Mayra Lorena Díaz Sosa



@malodi1982

2016-03-15

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 87 de 88

VII. Recursos complementarios

Esta presentación se encuentra disponible en la plataforma virtual *Mi Espacio de Aprendizaje*.

VII. Recursos complementarios

Regla de L'Hospital y fórmula de Taylor



<https://miespaciodeaprendizaje.moodlecloud.com>

Mayra Lorena Díaz Sosa

@malodi1982

# VIII. Bibliografía

Regla de L'Hospital y fórmula de Taylor



Adams, R. y Essex, Ch. (2010).

*Calculus, A complete course.*

7a. ed. Toronto: Pearson.



Apostol, T. (2009).

*Calculus I.*

Barcelona: Reverté.



Haaser, N., LaSalle, J. y Sullivan, J. (1998).

*Análisis matemático, Vol. I.*

México: Trillas.



Spivak, M. (2003).

*Calculus.*

2a. ed. México: Reverté.

2016-03-15

Unidad 4: Diferenciación y Derivadas, Diapositiva 88 de 88

## VIII. Bibliografía

Estos son algunos libros sugeridos para revisar con más detalle los temas vistos en la sesión de hoy y sus respectivas demostraciones, hacer ejercicios y practicar.

VIII. Bibliografía  
Regla de L'Hospital y fórmula de Taylor

- Adams, R. y Essex, Ch. (2010). *Calculus, A complete course.* 7a. ed. Toronto: Pearson.
- Apostol, T. (2009). *Calculus I.* Barcelona: Reverté.
- Haaser, N., LaSalle, J. y Sullivan, J. (1998). *Análisis matemático, Vol. I.* México: Trillas.
- Spivak, M. (2003). *Calculus.* 2a. ed. México: Reverté.

2016-03-15

¡Gracias!

¡Gracias!